

Guía de instrucciones para pacientes de infusión intravenosa por pulso

Preparación

1. Inspeccione su medicamento antes de usar. Si nota que tiene alguna fuga, grieta, decoloración o partículas en la solución, no lo use. Llame a su farmacia para obtener indicaciones.
2. Revise que su nombre, el nombre del medicamento y la dosis sean correctos y que no haya pasado la fecha de vencimiento o de uso recomendado.

Administración del medicamento

1. Restriegue el conector sin aguja con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se seque con el aire.
2. Quite la presilla del catéter (si tiene presilla).
3. Enjuague el conector sin aguja con una solución salina siguiendo las cantidades indicadas. **IMPORTANTE: Si tiene problemas para enjuagar la vía o si siente dolor, DETÉNGASE, no continúe. Llame a su enfermero(a) o farmacia para obtener indicaciones.**
4. Quite la tapa protectora del extremo de la jeringa de medicamento. No toque la punta de la jeringa descubierta con los dedos ni deje que tenga contacto con otras superficies.
5. Golpee suavemente la jeringa para conducir las burbujas de aire hacia la punta.
6. Jale levemente hacia atrás el émbolo para soltar cualquier sello de aire.
7. Presione el émbolo para expulsar el aire.
8. Conéctela al conector sin aguja girando y empujando en sentido horario hasta que quede fija y segura.
9. Para administrar el medicamento, presione el émbolo durante la cantidad de minutos que se indica en la etiqueta.



Al completar la infusión

1. Desconecte la jeringa vacía del conector sin aguja.
2. Restriegue el conector sin aguja con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se seque con el aire.
3. Enjuague el catéter con una solución salina siguiendo las cantidades indicadas.
4. Nuevamente, restriegue el conector sin aguja con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se seque con el aire.
5. Enjuague el catéter con un enjuague de heparina (si ha sido indicado) siguiendo las cantidades indicadas.
6. Coloque la presilla en el catéter (si tiene presilla) luego de finalizar los enjuagues.
7. Deseche la jeringa en la basura a menos que se le haya indicado lo contrario.